

	<b>AFF (Alopécie Frontale Fibrosante)</b>	<b>LPP (Lichen Plan Pilaire)</b>	<b>LECC (Lupus Érythémateux Cutané Chronique)</b>	<b>ACCC (Alopécie Cicatricielle Centrale Centrifuge)</b>	<b>Folliculite décalvante</b>	<b>Cellulite disséquante</b>
<b>Données démographiques</b>	adultes plus âgés, davantage de femmes	adultes	adultes jeunes ou d'âge moyen, davantage de femmes	jeunes adultes, davantage de femmes d'origine afro-caribéenne, antécédents d'usage de cosmétiques capillaires	adultes jeunes ou d'âge moyen, davantage d'hommes	jeunes adultes, davantage d'hommes d'origine africaine
<b>Apparition</b>	apparition progressive	apparition progressive	apparition progressive ou brutale	apparition progressive graduelle	apparition progressive graduelle	apparition progressive
<b>Symptômes</b>	rare démangeaisons, brûlures, douleurs	démangeaisons + (signe précoce), brûlures, douleurs	démangeaisons +, brûlures, douleurs	démangeaisons +, brûlures, douleurs	démangeaisons +, brûlures, douleurs	douleurs
<b>Perte de cheveux</b>	variable	variable	variable	variable	variable	variable
<b>Test de traction</b>	test de traction + sur les bords (phases actives)	+ cheveux anagènes	+ cheveux anagènes	+ cheveux anagènes	+ cheveux anagènes	+ cheveux anagènes
<b>Test de carte</b>	pas de repousse	pas de repousse	pas de repousse	pas de repousse	pas de repousse	pas de repousse
<b>Caractéristiques principales</b>	alopécie des sourcils souvent associée, alopécie cicatricielle en forme de bande touchant la ligne frontale des cheveux	plaques nues ou raréfaction diffuse, commençant souvent au niveau du vertex, érythème périfolliculaire et desquamation	plaques rondes/ovales bien circonscrites, plaques érythémateuses squameuses, modifications à l'intérieur de la plaque alopécique plutôt qu'à sa périphérie, bouchons folliculaires, télangiectasies, atrophie, dyspigmentation	Cicatrices symétriques et centrifuges sans inflammation évidente, le cuir chevelu peut être souple au toucher	cuir chevelu à prédominance vertex et occipital, formation de croûtes et de pustules, folliculite en touffes	le plus souvent au niveau du vertex ou à l'arrière du cuir chevelu, formation de nodules fermes ou fluctuants, de pustules et de croûtes, +/- drainage purulent du sinus
<b>Trichoscopie</b>	perte des ostia folliculaires, hyperkératose périfolliculaire, érythème et inflammation périfolliculaires, pili torti	perte des ostia folliculaires, desquamation périfolliculaire, incontinence pigmentaire (points bleu-gris) chez les patients à la peau foncée	érythème péripilaire, vaisseaux arborescents épais, bouchons kératosiques, gros points jaunes, points rouges folliculaires	halo péripilaire blanc/gris autour des cheveux naissants, taches blanches de cicatrices folliculaires interrompant le réseau pigmenté régulier en nid d'abeille, absence d'ostia folliculaires	polytrichie importante, écailles péripilaires blanc-jaune, hyperplasie péripilaire, zones blanches et rouge laiteux, absence d'ostia folliculaires	érythème marqué, pustules folliculaires, fente cutanée avec de multiples poils émergents.